

QUESTIONARIO**1****Azienda Sanitaria Locale di Vercelli**

Concorso Pubblico, per titoli ed esami,
per l'assunzione a tempo indeterminato di
n. 2 Dirigenti Psicologi - Psicoterapia

NON STRAPPARE

l'involucro di plastica prima che venga
dato il segnale di inizio della prova

VERSIONE QUESTIONARIO

003000001



**INCOLLARE SUL
MODULO RISPOSTE
IL CODICE A BARRE
A FIANCO**

Questionario 0030000001 - Versione 00000

- 1. Nell'anoressia nervosa, la capacità di modificare il comportamento in funzione dei cambiamenti ambientali può corrispondere a scarsa performance nel:**
 - A. Iowa Gambling Task
 - B. Wisconsin Card Sorting Test
 - C. Token Test
 - D. WISC-IV
- 2. The Heart Manual, materiale educativo utilizzato per la riabilitazione nel periodo successivo a infarto del miocardio, è stato sviluppato nell'ambito di quale modello:**
 - A. Modello delle credenze sulla salute
 - B. Modello transteoretico
 - C. Modello dei mediatori di salute
 - D. Modello delle teorie implicite di benessere
- 3. L'Indice di Abilità Generale (IAG) della scala WISC-IV è dato dalla somma dei sub-test inclusi negli indici di:**
 - A. Velocità Esecutiva e Memoria di Lavoro
 - B. Ragionamento Visuo-Percettivo e Memoria di Lavoro
 - C. Comprensione Verbale e Ragionamento Visuo-Percettivo
 - D. Comprensione Verbale e Memoria di Lavoro
- 4. Cosa si intende per disorganizzazione sintattica?**
 - A. Difficoltà nel controllo della segmentazione sillabica e non fonemica
 - B. Mancata acquisizione del concetto di struttura interna della parola o della frase
 - C. Difficoltà di combinazione delle parole tramite l'applicazione di regole al fine di trasmettere significati
 - D. Repertorio limitato di grafismi
- 5. Il Postpartum Depression Predictors Inventory è composto da:**
 - A. 32 item prenatali, 39 item post-partum e da 7 item riguardanti presenza di life-stress events
 - B. 39 item prenatali e da 32 item post-partum e da 7 item riguardanti presenza di life-stress
 - C. 32 item prenatali e da 39 item post-partum
 - D. 39 item prenatali e 32 item post-partum
- 6. L'effetto "Primacy" in compiti di apprendimento di liste di parole**
 - A. è gravemente deteriorato nelle alterazioni della MBT
 - B. è gravemente deteriorato nelle alterazioni della MLT
 - C. è una tecnica utilizzata per valutare il ricorso a strategie attive implicate nei processi di organizzazione visuo-spaziale
 - D. indica un buon funzionamento della MLT
- 7. Quale delle seguenti affermazioni sui criteri diagnostici dell'ICD-10 è vera ?**
 - A. per formulare disturbo di personalità anancastico secondo i criteri ICD-10 devono essere presenti almeno tre dei criteri citati
 - B. la sindrome depressiva ricorrente con sintomi psicotici non è una categoria diagnostica ICD-10
 - C. per formulare diagnosi di disturbo di personalità antisociale secondo i criteri ICD-10 devono essere presenti almeno tre dei criteri citati
 - D. il disturbo narcisistico di personalità non è compreso nella categoria "altri disturbi di personalità" nell'ICD-10
- 8. Secondo il Rapporto sulla prevenzione del maltrattamento all'infanzia in Europa pubblicato dall'OMS nel 2013**
 - A. 55 milioni di bambini sono vittime di maltrattamento
 - B. 44 milioni di bambini sono vittime di violenza psicologica
 - C. 18 milioni di bambini sono vittime di abuso sessuale
 - D. 35 milioni di bambini sono vittime di maltrattamento
- 9. Per metanalisi si intende:**
 - A. una revisione della letteratura scientifica esistente riguardante uno specifico argomento
 - B. un metodo statistico che consente di integrare e riassumere gli indici parametrici di campioni omologhi in diverse ricerche
 - C. una rassegna della letteratura scientifica esistente riguardante l'efficacia di un trattamento
 - D. una revisione della letteratura scientifica che confronta i risultati di studi diversi sullo stesso argomento
- 10. Quali sono i magazzini di memoria individuati dalla Teoria dell'Elaborazione dell'Informazione?**
 - A. Memoria a breve termine, memoria di lavoro e memoria a lungo termine
 - B. Memoria sensoriale, memoria a breve termine e memoria a lungo termine (o di lavoro)
 - C. Memoria sensoriale, memoria a breve termine (o di lavoro) e memoria a lungo termine
 - D. Memoria a breve termine, memoria a lungo termine, memoria semantica

11. In che tipo di paziente si incontra generalmente un disturbo di ipermnesia?

- A. Negli idiot-savant e in pazienti con recente trauma cerebrale prefrontale
- B. Negli oligofrenici, in pazienti che soffrono di disturbi d'ansia o maniacali e in pazienti che esperiscono stati crepuscolari epilettici
- C. L'ipermnesia è un disturbo aspecifico, che si può ritrovare in una varietà di pazienti differenti, anche non patologici
- D. Nei pazienti split-brain che hanno precedentemente sofferto di epilessia globale

12. Quali sono gli stadi dello sviluppo secondo Piaget?

- A. Periodo sensomotorio, periodo preoperatorio, periodo delle operazioni concrete, periodo delle operazioni formali e periodo super-formale
- B. Periodo sensomotorio, periodo preoperatorio, periodo delle operazioni concrete e periodo delle operazioni formali
- C. Periodo preoperatorio, periodo delle operazioni formali e stadio dell'identità
- D. Periodo sensomotorio, periodo delle operazioni concrete e periodo delle operazioni formali

13. Il test MMPI-2-RF è composto da:

- A. 11 scale base e 20 scale speciali
- B. 3 scale di validità e 28 scale cliniche
- C. 40 scale
- D. 50 scale

14. I disturbi alimentari:

- A. Sono comportamenti che si distaccano in misura notevole dalle richieste biologiche dell'organismo e dagli standard culturali, determinando talvolta variazioni patologiche del peso corporeo
- B. Sono comportamenti che si distaccano in misura notevole dalle richieste biologiche dell'organismo e dagli standard culturali, determinando sempre variazioni patologiche del peso corporeo
- C. Sono sempre dipendenti solo da fattori di tipo ambientale che agiscono sull'individuo altrimenti sano
- D. Sono tutti quei comportamenti che determinano variazioni repentine e talvolta patologiche del peso corporeo

15. L'approccio integrato dell'EMDR utilizza:

- A. 8 fasi e un protocollo a 3 stadi (passato, presente, futuro)
- B. 6 fasi e un protocollo a 2 stadi (passato, presente)
- C. 6 fasi e un protocollo a 3 stadi (passato, presente, futuro)
- D. 4 fasi e un protocollo a 2 stadi (passato, presente)

16. Quale di queste affermazioni sulla *dissonanza cognitiva* è errata?

- A. Si tratta di una sensazione di malessere provocata da informazioni discrepanti con il concetto di noi stessi come esseri ragionevoli ed intelligenti
- B. Nella maggioranza dei casi, per ridurla gli individui tendono a cambiare il proprio comportamento, accordandolo con la cognizione altrimenti incoerente
- C. E' molto forte quando compiamo un'azione che minaccia l'immagine che abbiamo di noi stessi, creando discrepanza fra il modo in cui pensiamo di essere e il modo in cui ci comportiamo
- D. Nella sua concezione originaria, Festinger la definisce come un'incoerenza fra due cognizioni (pensieri o opinioni)

17. Alcune ricerche su minori vittime di violenza hanno evidenziato una caratteristica della rivelazione cosiddetta "a grappolo". Cosa significa?

- A. Narrazione oscillante che emerge dopo alcune sospensioni alle affermazioni autentiche
- B. Narrazione oscillante tra resistenze, racconti, ritrattazioni e riaffermazioni
- C. Narrazione che tende ad oscurare affermazioni autentiche per lasciar trapelare falsi ricordi
- D. Rivelazione di particolari progressivamente più specifici relativi alla situazione, ai comportamenti e alle sensazioni

18. Lo studio di standardizzazione della metodologia "C.B.C.A. - Criteria-Based Content Analysis" (STELLER e KOEHNKEN) per la validazione delle rivelazioni di abuso fornite da minori ha definito i seguenti cut-off:

- A. ≤8 casi dubbi/molto dubbi, >12 casi confermati
- B. <12 casi dubbi/molto dubbi, ≥18 casi confermati
- C. <10 casi dubbi/molto dubbi, >16 casi confermati
- D. <5 casi dubbi/molto dubbi, ≥16 casi confermati

19. Il concetto di "Falso Sé" è stato formulato da:

- A. Kernberg
- B. Winnicott
- C. Kouth
- D. Bion

20. Nel test di Rorschach, le risposte di "Contaminazione" sono:

- A. Risposte in cui il soggetto vede un unico percetto, in cui fonde aspetti appartenenti a regni diversi o a specie diverse
- B. Risposte in cui il soggetto vede rappresentati allo stesso tempo due percelli che tra loro dovrebbero essere separati
- C. Tutte le risposte sono corrette
- D. Nessuna delle risposte è corretta

21. Secondo la classificazione del DSM IV TR il Disturbo d'Ansia Generalizzato è definito da:

- A. Stato d'ansia persistente e di attesa apprensiva che si protrae per più di 2 mesi
- B. Stato d'ansia persistente e di attesa apprensiva che si manifesta quotidianamente da almeno 3 mesi, talvolta accompagnato da sintomi fisici quali dispnea e tachicardia
- C. Stato d'ansia persistente e di attesa apprensiva che si protrae per più di 6 mesi
- D. Stato d'ansia persistente e di attesa apprensiva che si è stabilizzato in una condizione cronica e può associarsi ad attacchi di panico

22. Secondo il DSM-IV TR, un punteggio di Funzionamento Globale dell'Asse V compreso tra 70 e 61 descrive:

- A. Lieve compromissione nel funzionamento sociale, lavorativo o scolastico, con rari conflitti interpersonali e temporaneo arretramento nel rendimento lavorativo e/o scolastico
- B. Qualche difficoltà nel funzionamento sociale, lavorativo o scolastico, ma il soggetto in generale funziona bene, mantenendo relazioni interpersonali significative
- C. Difficoltà moderate nel funzionamento sociale, lavorativo o scolastico, scarse relazioni interpersonali, frequenti conflitti con compagni o colleghi
- D. Presenza di difficoltà di grado medio-grave nel funzionamento sociale, lavorativo o scolastico, nonché nelle relazioni interpersonali

23. Cosa si intende con il termine "Craving"?

- A. "Abbuffate" durante le quali c'è un devastante senso di perdita del controllo e un'assunzione esagerata di quantità di cibo
- B. Desiderio irresistibile ed intrusivo di assumere una sostanza, che comporta la perdita di controllo e la messa in atto di una serie di azioni tese alla sua soddisfazione
- C. Tecnica terapeutica cognitivo-comportamentale volta a sviluppare la capacità di autocontrollo degli impulsi da parte del soggetto
- D. Difficoltà nel controllo degli impulsi e dei comportamenti appetitivi

24. La numerosità del campione normativo originario del MMSE (Folstein, 1973) è:

- A. Inferiore a 100
- B. Tra 100 e 200
- C. Tra 300 e 500
- D. Superiore a 500

25. I soggetti con Mild Cognitive Impairment (M.C.I.) ottengono al MMSE un punteggio:

- A. Compreso tra 19 e 24
- B. Inferiore a 16
- C. Inferiore a 24
- D. Uguale o Superiore a 23

26. L' ICD-10 cap. V è:

- A. Una classificazione diagnostica multiassiale dei disturbi psichici infantili predisposta dall'OMS
- B. Una classificazione dell'OMS per le sindromi e i disturbi psichici e comportamentali
- C. Un sistema diagnostico, ateoretico e multiassiale predisposto dall'American Psychiatric Association (APA)
- D. Un sistema nosografico codificato di malattie e sindromi per scopi diagnostici ed epidemiologici

27. La Sindrome di Asperger nel DSM 5:

- A. E' classificata come condizione sanitaria a sé stante
- B. E' classificata insieme ai disturbi dello spettro autistico
- C. E' classificata insieme ai disturbi neurologici
- D. E' classificata insieme alle psicosi

28. L'identificazione proiettiva di M. Klein è:

- A. Un meccanismo di difesa tipico della posizione depressiva
- B. Un meccanismo di difesa evoluto che caratterizza le personalità nevrotiche
- C. Un meccanismo di difesa tipico della posizione schizoparanoide
- D. Nessuna delle risposte è corretta

29. Negli studi psicoanalitici che originano dall'infant research, i concetti di "Now moment" e "Moment of meeting" descrivono particolari momenti del lavoro clinico e sono stati sviluppati da:

- A. Donnel Stern in "Partners in Thought: working with unformulated experience, dissociation and enactment" (2009)
- B. Daniel Stern in "The Psychotherapy and Everyday life" (2004)
- C. Stephen Mitchell in "Relationality: from attachment to intersubjectivity" (2000)
- D. Nessuna delle risposte è corretta

30. La WISC IV è applicabile per misurare il QI totale in bambini di età compresa tra:

- A. 5,6 e 16,11 anni
- B. 6 e 16,11 anni
- C. 6 e 15,11 anni
- D. 7 e 15 anni